

Western Blot 牛血清白蛋白封闭液 (1 x in PBST)

产品编号	产品名称	包装
MA0100	Western Blot 牛血清白蛋白封闭液 (1 x in PBST)	400ml

产品简介:

Western Blot 牛血清白蛋白封闭液 (1 x in PBST) 可以用于 Western blot 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭。封闭后, 可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比, 以达到理想的显色效果。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
1	Western 封闭液溶剂	400ml
2	Western 封闭液溶质	20g
3	说明书	1 份

保存条件:

2-8°C 保存。

使用说明:

1. 使用时称取 5g 溶质加入到 100ml 溶剂中, 充分溶解后即可使用。每次实验建议现用现配。
2. 蛋白转膜后将转印膜置于容器中, 加入足够量的配好的膜封闭液充分覆盖膜, 室温下振荡封闭半小时至 1 小时, 即完成膜的封闭, 然后进行一抗孵育等后续操作。

注意事项:

1. 通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体, 可以 4°C 封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 3.