

Etodolac (AY-24236); 依托度酸


产品编号: MB1447

质量标准: ≥98%,BR

包装规格: 100MG

产品形式: solid

基本信息

分子式	C17H21NO3	结构式	
分子量	287.36		
CAS No.	41340-25-4		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	乙醇: 50 mg/mL Water: Insoluble		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介: 依托度酸 Etodolac (AY-24236) 是非甾体抗炎化合物。

别名: AY-24236 ; 2-(1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid

物理性状及指标:

外观:白色结晶性粉末

熔点:144~150°C

溶解性:乙醇: 50 mg/mL; Water Insoluble

含量:≥98%

储存条件: 常温, 避光防潮密闭干燥

生物活性 (仅来自于公开文献)

产品描述	Etodolac 是 COX 抑制剂, IC50 为 53.5 nM。
靶点	COX
体外研究	在离体兔关节软骨细胞中, Etodolac 显著抑制 ICI, TNFα活化的 vol, 以及随后的凋亡事件例如凋亡性细胞体积减小(AVD)和 caspase-3/7 活性的增高。
体内研究	在机械异常性疼痛的小鼠模型中, Etodolac 通过 COX-依赖性途径衰减 paclitaxel 引起的周围神经病变。在佐剂关节炎大鼠中, Etodolac 和其他 NSAID 以剂量依赖的方式抑制足

肿胀,引起胃黏膜损伤。在关节炎大鼠中, Etodolac 表现出最高的 UD (50) 值 and 安全性指标。除了当其作用是由在正常大鼠中醋酸诱导的扭体评估, Etodolac 表现出最高的 UD (50) 值 and 安全性指标。在佐剂关节炎大鼠中, Etodolac 剂量依赖性抑制胃癌的发展, 并 30 毫克/千克/天剂量时没有癌症检测到。在 Helicobacter pylori (Hp) 感染的蒙古沙鼠 (MGS) 的胃中, Etodolac 不影响炎性细胞浸润或氧化性 DNA 损伤的程度, 但是它显著抑制粘膜细胞的增殖并剂量依赖性抑制肠上皮组织转化的发展。在 CCI 大鼠中, Etodolac 减轻热诱发痛觉过敏并阻断 CCI 侧 TRAP 阳性多核破骨细胞数的增加, 但是, 它不抑制 CCI 侧骨矿物质含量 (BMC) 和骨矿物质密度 (BMD) 上的降低。

美仑相关产品推荐(更多相关靶点抑制剂请详询官网或客服)

MB1426	萘丁美酮/萘普酮
MB3613	NS398
MB8193	Rofecoxib

用途及描述: 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 严禁用于人体。本品为非甾体抗炎化合物。具有抗炎、解热和镇痛作用。其作用机理可能是通过阻断环氧合酶的活性, 从而抑制了前列腺素 (PG) 的合成。

储液配置:

体 DMSO 质 量 浓度 积	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	3.4801 mL	17.4004 mL	34.8008 mL
5 mM	0.6960 mL	3.4801 mL	6.9602 mL
10 mM	0.3480 mL	1.7400 mL	3.4801 mL
50 mM	0.0696 mL	0.3480 mL	0.6960 mL

【注意】

- 我司产品为非无菌包装, 若用于细胞培养, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装: 您收到货物后最好不要自己进行分包, 因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质; 如您有特殊包装要求, 请在订购时候与我们客服代表阐明, 当然价格会做适当调整。对于开盖后, 长期未使用的, 请务必重新密封好, 建议 Parafilm 封口膜, 并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长, 超过产品有效期, 建议您重新购买, 以免影响实验质量。

2 储备液制备: 大部分试剂的溶液形式稳定性较差, 请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液, 请选择用合适溶剂, 细胞培养类多选择 DMSO, 储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存, 一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前, 再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备: 请根据个人需要正确计算浓度, 稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的, 所以使用水性溶剂 (如 PBS) 稀释时, 可能会析出沉淀, 可通过超声使固体重

新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度<0.3%,以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度<5%,以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。