人血清白蛋白；albumin from human serum

产品编号：MB1866
质量标准：生物级
包装规格：500MG；1G
产品形式：冻干粉
基本信息

分子量	66478 Da	结构式	
CAS No.	70024-90-7		
储存条件	2-8℃，避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25℃)	Water（≥50mg/mL）		
其他说明	为了您的安全，请佩戴一次性口罩和手套进行操作。		

简介：人血清白蛋白合成于肝脏中，是人血浆中含量最为丰富的蛋白之一。本产品可用来研究头孢托仑对耐青霉素肺炎链球菌的体外抗菌活性影响等。

物理性状及指标 ：

外观：.....冻干粉

溶解性：.....Water（≥50mg/mL）

杂质：.....HIV Ⅰ，HIVⅡ，HCV 和 HBsAg 检测结果为阴性

含量：.....≥96%（琼脂糖凝胶电泳）

储存条件：2-8℃，避光防潮密闭干燥

生物活性

用白蛋白测定头孢妥仑对耐青霉素肺炎链球菌的体外杀菌活性。它已被临床用于严重且常常危及生命的情况，例如创伤、烧伤和手术造成的休克和血液损失。

美仑相关产品推荐

MB4219	牛血清白蛋白(BSA);牛血清白蛋白组分五
MA0111	牛血清白蛋白, 20 mg/ml BSA
MA0067	牛血清白蛋白溶液 0.5mg/ml
MB0274	无蛋白酶牛血清白蛋白
MB0094	无脂肪酸牛血清白蛋白
MB0004	低内毒素牛血清白蛋白

用途及描述 ：科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。Albumin 是血浆中最丰富的蛋白质。本品为肝产人血白蛋白。血清白蛋白作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白，在调节血液胶体渗透压方面起着至关重要的作用。白蛋白也被认为与外源性物质结合，特别是药物(如布洛芬、华法林)，并强烈影响其药代动力学。氧化应激导致白蛋白氧化还原状态的改变，对其生理功能的影响是多种多样的。

人血清白蛋白配制及储存：

水中溶解度≥50mg/ml，根据自己实验需要配制相关浓度，-20 储存稳定数月。

【注意 】

●我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。

●部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

参考文献：

1. T. Scott and M. Eagleson, Concise Encyclopedia: Biochemistry, 2nd Ed., pp. 19-20, Walter de Gruyter, New York (1988).

2. Contact-dependent growth inhibition requires the essential outer membrane protein BamA (YaeT) as the receptor and the inner membrane transport protein AcrB.

3. Lipid starvation and hypoxia synergistically activate ICAM1 and multiple genes in an Sp1-dependent manner to promote the growth of ovarian cancer.

活性化合物操作注意事项

1 **产品分装：**您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。 如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度<0.3%,以避免细胞毒性。 灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度<5%,以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到官底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，官底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定成了误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。

s240602