

## Dofetilide ; 多非利特


产品编号 : MB3725

质量标准 : >98%,BR

包装规格 : 50MG;200MG

产品形式 : powder

### 基本信息

分子式	C19H27N3O5S2	结 构 式	
分子量	441.56		
CAS No.	115256-11-6		
储存条件	常温, 避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	DMSO 88 mg/mL warmed (199.29 mM) Water : Insoluble Ethanol : Insoluble		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

**简介 :** 多非利特 Dofetilide(Tikosyn)是 III 型抗心律失常药, 能阻断钾离子通道。

**别名 :** UK 68789 ; Methanesulfonamide, N-[4-[2-[methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]-

### 物理性状及指标 :

外观 : .....白色至类白色粉末

溶解性 : .....DMSO 88 mg/mL warmed (199.29 mM) ; Water : Insoluble ; Ethanol : Insoluble

含量 : .....>98%

**储存条件 :** 常温, 避光防潮密闭干燥

### 生物活性

<b>产品描述</b>	Dofetilide 是一种选择性的 potassium channel (hERG)阻断剂, 用作 III 型抗心律失常药。
<b>靶点</b>	Potassium channel
<b>体外研究</b>	在爪蟾卵母细胞离体培养中, Dofetilide 阻断 HERG 电流。在豚鼠心肌中, Dofetilide (1 μM) 降低 IKR 的幅度到对照组电流的 61%, 如通过 200 毫秒的测试脉冲和去激活尾电流 IKR 的分析测量。在完整犬心脏中, Dofetilide 增加 apico-基底视差, 是尖端比基底的明显

	更多的 ERPs 的增加。
<b>体内研究</b>	在陈旧性心肌梗死 (MI) 犬中, Dofetilide (100 毫克/公斤, 腹腔注射) 不抑制由两级冠状动脉结扎和肾上腺素或冠状动脉结扎和再灌注引起的心律失常, 但由 PES 所致抑制折返心律失常。在食用 digitalis arrhythmia 的狗中, Dofetilide 还显示出了抗心律失常作用。Dofetilide 增加 QT 间期, 并显示这样的其它 III 类药物负性变的效果, 但是与其他类的不同在抗心律失常型材三剂, 例如 D-索他洛尔, E-4031, 并在其不阻止的 MS-551 心室纤颤 (VF) 立即冠状动脉再灌注后的发生, 并且对 digitalis arrhythmia 失常某些抗心律失常作用。在 SD 大鼠中, Dofetilide 导致再吸收的增加, 和阶段依赖性畸形。

**美仑相关产品推荐(更多相关靶点抑制剂请详询官网或客服)**

MB4140	TRAM-34
MB3726	富马酸沃诺拉赞 (TAK-438)
MB2085	瑞格列奈
MB1691	Tolbutamide

**用途及描述:** 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 严禁用于人体。多非替利特是一种 III 类抗心律失常和 hERG 通道阻滞剂。多非替利特选择性地阻断延迟整流外向钾电流(IKr)的快速成分。本品可用于相关领域的科研实验。

**储液配置**

体 浓度	质量 积		
	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	2.2647 mL	11.3235 mL	22.6470 mL
5 mM	0.4529 mL	2.2647 mL	4.5294 mL
10 mM	0.2265 mL	1.1323 mL	2.2647 mL
50 mM	0.0453 mL	0.2265 mL	0.4529 mL

**【注意】**

- 我司产品为非无菌包装, 若用于细胞培养, 请提前做预处理, 除去热原细菌, 否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息, 我司不保证所提供信息的权威性, 以上数据仅供参考交流研究之用。

**活性化合物操作注意事项**

**1 产品分装：**您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

**2 储备液制备：**大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

**3 细胞培养工作液制备：**请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 <0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

**4 体内动物实验应用：**由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 <5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表  
动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

## 5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。