

LY 2608204 ; LY2608204


产品编号 : MB4334

质量标准 : >98%,BR

包装规格 : 100mMx200ul ; 5MG ; 25MG

产品形式 : solid

基本信息

分子式	C28H37N3O3S3	结构式	
分子量	559.81		
CAS No.	1234703-40-2		
储存条件	-20°C, 避光防潮密闭干燥		
溶解性(25°C)	DMSO : 112 mg/mL (200.06 mM) Water : Insoluble Ethanol : 35 mg/mL (62.52 mM)		
注意事项	溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介 : LY2608204 是葡萄糖激酶 (GK) 活化剂。

别名 : Cyclopropanecarboxamide, 2-cyclohexyl-1-[4-(cyclopropylsulfonyl)phenyl]-N-[5-[[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]thio]-2-thiazolyl]-, (1R,2S)-

物理性状及指标 :

外观 :白色至类白色固体

溶解性 :DMSO : 112 mg/mL (200.06 mM) ; Water : Insoluble ; Ethanol : 35 mg/mL (62.52 mM)

含量 :>98%

储存条件 : -20°C, 避光防潮密闭干燥

生物活性

产品描述	LY2608204 可以激活葡萄糖激酶(GK), EC50 为 42 nM。
靶点	glucokinase 42 nM(EC50)
体外研究	LY2608204 可以激活葡萄糖激酶(GK), 对 10 mM 葡萄糖 EC50 为 42 nM, 对更低浓度的葡萄糖这种激活作用具有浓度依赖的特性。LY2608204 也可以刺激大鼠胰岛瘤 INS1-E 细胞中

	的葡萄糖代谢，EC50 为 579 nM.
体内研究	LY2608204 对于快速升高的以及餐后的高血糖都有降血糖的作用，这种作用具有剂量依赖的特性. 在使用高剂量(30 mg/kg)药物时与对照组相比，对葡萄糖 AUC 的最大降糖作用可达 42%. 插值法分析显示当血浆中 LY2608204 平均浓度为 99 ng/mL (179 nM)时，即相当于 6.9 mg/kg LY2608204 剂量，葡萄糖 AUC 浓度会下降 20%. 在 5 分钟后大脑中药物总量的均值为 0.539 nmol/g 时，体内血脑屏障对 LY2608204 的通透率平均值为大脑比血浆等于 0.17。

美仑相关产品推荐(更多相关靶点抑制剂请详询官网或客服)

MB6107	AMG-3969
MB6088	AZD1656
MB6102	MK-0941

用途及描述：科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。LY2608204 是葡萄糖激酶（GK）活化剂。本品可用于相关领域的科研实验。

储液配置

体 浓度	质量 积	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM		4.5612 mL	22.8061 mL	45.6121 mL
5 mM		0.9122 mL	4.5612 mL	9.1224 mL
10 mM		0.4561 mL	2.2806 mL	4.5612 mL
50 mM		0.0912 mL	0.4561 mL	0.9122 mL

经典实验操作（仅供参考）

动物实验	<p>Animal Models: 雄性 Wistar 大鼠，体重 225-250 g</p> <p>Formulation: 将 LY2608204 在 solutol 和乙醇 1:1 混合液中配制成悬浮液放于水浴超生破碎仪中(总体积的 10%). 得到的悬浮液用 9 倍体积的 10% solutol 水溶液进行稀释</p> <p>Dosages: 1, 3, 6, 10, 20, 和 30 mg/kg</p> <p>Administration: LY2608204 口服给药 2 小时后，大鼠按 2 g/kg 的剂量口服葡萄糖药丸.</p>
------	---

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 <0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 <5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表
动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG 的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品

附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。