

SBC-115076


产品编号: MB4337

质量标准: >98%, PCSK9 拮抗剂

包装规格: 5MG;25MG

产品形式: solid

基本信息

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 分子式 | C31H33N3O5 | 结 构 式 |  |
| 分子量 | 527.61 | | |
| CAS No. | 489415-96-5 | | |
| 储存条件 | -20℃, 避光防潮密闭干燥 | | |
| 溶解性 (25℃) | DMSO: 100 mg/mL (189.53 mM) Water: Insoluble Ethanol: Insoluble | | |
| 注意事项 | 溶解性是在室温下测定的, 如果温度过低, 可能会影响其溶解性。 | | |
| 其他说明 | 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。 | | |

简介: SBC-115076 是抗促蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶 Kexin9 型 (抗 PCSK9) 的化合物, 用于治疗 and/或预防心血管疾病。

别名: 2H-Pyrrol-2-one, 1,5-dihydro-3-hydroxy-4-[3-methyl-4-(phenylmethoxy)benzoyl]-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-(4-pyridinyl)-

物理性状及指标:

外观:类白色至淡黄色粉末

溶解性:DMSO: 100 mg/mL (189.53 mM); Water: Insoluble; Ethanol: Insoluble

含量:>98%

储存条件: -20℃, 避光防潮密闭干燥

生物活性

| | |
|------|------------------------------------------------|
| 产品描述 | SBC-115076 是一种有效的细胞外蛋白质原转化酶枯草溶菌素 9(PCSK9)的拮抗剂。 |
| 靶点 | PCSK9 |
| 体外研究 | 在 HepG2 细胞中, SBC-115076 增加荧光性 Dil-LDL 的摄取。 |
| 体内研究 | 在高脂饮食的小鼠中, SBC-115076 (8 mg/kg)降低 32%的胆固醇水平。 |

用途及描述: 科研试剂, 广泛应用于分子生物学, 药理学等科研方面, 严禁用于人体。SBC-115076 是抗促蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶 Kexin9 型 (抗 PCSK9) 的化合物, 用于治疗 and/或预防心血管疾病。

储液配置

| | | | | |
|--------|----|------|------|-------|
| 体 积 | 质量 | 1 mg | 5 mg | 10 mg |
| | 浓度 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|
| 1 mM | 1.8953 mL | 9.4767 mL | 18.9534 mL |
| 5 mM | 0.3791 mL | 1.8953 mL | 3.7907 mL |
| 10 mM | 0.1895 mL | 0.9477 mL | 1.8953 mL |
| 50 mM | 0.0379 mL | 0.1895 mL | 0.3791 mL |

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅能提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储存液，请选用合适溶剂，细胞培养类多选择 DMSO，储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。

灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表动物体表面积等效剂量换算表

| 物种 | 体重(KG) | 体表面积(M2) | Km 系数 |
|----|--------|----------|-------|
| 狒狒 | 12 | 0.6 | 20 |
| 狗 | 10 | 0.5 | 20 |
| 猴 | 3 | 0.24 | 12 |
| 兔 | 1.8 | 0.15 | 12 |
| 豚鼠 | 0.4 | 0.05 | 8 |
| 大鼠 | 0.15 | 0.025 | 6 |
| 仓鼠 | 0.08 | 0.02 | 5 |
| 小鼠 | 0.02 | 0.007 | 3 |

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于500MG的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在200转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

| 标示重量范围 | 误差范围 |
|----------|-------|
| 1-20MG | 0.1MG |
| 50-500MG | 1MG |
| >1G | 3-5MG |

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。