


Difluprednate(DFBA)

产品编号：MB4340
质量标准：>98%,BR
包装规格：100MG;1G
产品形式：solid

基本信息

分子式	C27H34F2O7	结构式	
分子量	508.55		
CAS No.	23674-86-4		
储存条件	2-8°C，避光防潮密闭干燥		
溶解性 (25°C)	DMSO：100 mg/mL (196.63 mM)		
	Water：Insoluble		
	Ethanol：25 mg/mL (49.15 mM)		
注意事项	溶解性是在室温下测定的，如果温度过低，可能会影响其溶解性。		
其他说明	为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。		

简介： Difluprednate(Durezol)是一种皮质类固醇。

别名： 二氟泼尼酯；Pregna-1,4-diene-3,20-dione,
21-(acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-17-(1-oxobutoxy)-, (6 α ,11 β)-

物理性状及指标：

外观：.....白色至类白色固体

溶解性：.....DMSO：100 mg/mL (196.63 mM)；Water：Insoluble；Ethanol：25 mg/mL (49.15 mM)

含量：.....>98%

储存条件： 2-8°C，避光防潮密闭干燥

生物活性

产品描述	Difluprednate (difluoroprednisolone butyrate acetate,或 DFBA) 是一种合成的二氟化 Prednisolone 衍生物,
体外研究	Difluprednate 眼部药剂的活性代谢产物, 6 α ,9-difluoroprednisolone 17-butyrate (DFB), 作用于糖皮质激素受体有最低的 Ki 值(611 nM), 其活性显著高于 Prednisolone, Ki 值为 3.4 nM。
体内研究	Difluprednate 乳液在大鼠和兔子的房水迅速脱乙酰化成 difluoroprednisolone butyrate (DFB), 药物的活性代谢物, 具有相似的糖皮质激素活性。放射性标记的 Difluprednate 被滴加在有颜色兔的右眼进行专门研究检测 DFBA 分泌代谢。Difluprednate (0.05%乳剂)使得比悬浮在兔眼中有更高的房水浓度。Difluprednate 浓度 \geq 0.01%, 统计显示了在兔模型中相比盐水可显著抑制炎症, 以依赖性剂量的方式与抗炎进行反应。Difluprednate 以三个浓度 (0.002%, 0.01%和 0.05%) 作用于大鼠均可抑制葡萄膜炎, 这种作用具有剂量依赖性。Difluprednate 0.05%统计显示其抗炎活性优于 Betamethasone (0.1%)。

用途及描述： 科研试剂，广泛应用于分子生物学，药理学等科研方面，严禁用于人体。Difluprednate(Durezol)是一种皮质类固醇，是一种合成的二氟化 Prednisolone 衍生物,可作用于术后眼睛疼痛和炎症。

储液配置

体 积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	1.9664 mL	9.8319 mL	19.6637 mL
5 mM	0.3933 mL	1.9664 mL	3.9327 mL
10 mM	0.1966 mL	0.9832 mL	1.9664 mL
50 mM	0.0393 mL	0.1966 mL	0.3933 mL

【注意】

- 我司产品为非无菌包装，若用于细胞培养，请提前做预处理，除去热原细菌，否则会导致染菌。
- 部分产品我司仅提供部分信息，我司不保证所提供信息的权威性，以上数据仅供参考交流研究之用。

活性化合物操作注意事项

1 产品分装：您收到货物后最好不要自己进行分包，因为分包环境、包装材料等因素可能导致分包后的产品变质；如您有特殊包装要求，请在订购时候与我们客服代表阐明，当然价格会做适当调整。对于开盖后，长期未使用的，请务必重新密封好，建议 Parafilm 封口膜，并按照相应储存条件使用。如果放置时间过长，超过产品有效期，建议您重新购买，以免影响实验质量。

2 储备液制备：大部分试剂的溶液形式稳定性较差，请优先采用现用现配的方式。如需制备储备液，请选用合适溶剂 细胞培养类多选择 DMSO 储备液制备完成后请于零下 80 摄氏度储存，一般可以稳定存在 3-6 个月以上。在使用前，再对储备液进行稀释。避免储备液反复冻融。

3 细胞培养工作液制备：请根据个人需要正确计算浓度，稀释储备液或者直接用粉末配置工作液。由于大部分化合物是脂溶性的，所以使用水性溶剂（如 PBS）稀释时，可能会析出沉淀，可通过超声使固体重新溶解，不会对实验产生影响。如用 DMSO 作为溶剂，请确保 DMSO 最终使用浓度 < 0.3%，以避免细胞毒性。灭菌方式，我们建议通过 0.22UM 微膜过滤方式除菌，请勿采用紫外，射线或者高温灭菌方式，否则会影

响化合物活性，甚至破坏其结构导致彻底失活。

4 体内动物实验应用：由于很多化合物是脂溶性的，动物实验工作液配制失活，可能会需要加入一些药用辅料作为助溶剂，如吐温，CMC-NA，甘油等，具体需要客户查阅相关文献决定。如使用 DMSO，请确保 DMSO 的终浓度 < 5%，以避免毒性作用。给药剂量设计时候，可以参考下表

动物体表面积等效剂量换算表

物种	体重(KG)	体表面积(M2)	Km 系数
狒狒	12	0.6	20
狗	10	0.5	20
猴	3	0.24	12
兔	1.8	0.15	12
豚鼠	0.4	0.05	8
大鼠	0.15	0.025	6
仓鼠	0.08	0.02	5
小鼠	0.02	0.007	3

动物 A(mg/kg)=动物 B(mg/kg) X 动物 B 的 Km 系数/动物 A 的 Km 系数

5 关于产品到货处理及验收

您收到产品后，请及时查验产品的包装完整性，并对数量进行确认。对于很多微量的产品，数量低于 500MG

的，我们出厂前都是保证正确数量包装的。由于产品包装可能在运输过程中倒置，从而导致产品附着在管壁或者盖子上，这时候请不要先打开盖子，需正位放置轻轻拍打，使产品沉降到管底。对于液体产品，可以在 200 转左右稍作离心，管底收集液体，从而避免损失。

产品标签标示重量会有一定误差，在下面范围内均属于我司正常范围，望周知

标示重量范围	误差范围
1-20MG	0.1MG
50-500MG	1MG
>1G	3-5MG

为什么会看起来包装瓶是空的，如果您购买的产品的量非常小，同时有些产品在冻干的过程中粘附在管壁上形成薄薄的一层，可能观察不到产品的存在。您可以加入指定溶剂（参照操作手册）并涡旋或超声震荡使之完全溶解。

对于蜡状或油状的产品很难取出称量它们的质量，我们建议您用合适的溶剂直接溶解该化合物；对于具有吸湿性的化合物，暴露在空气中会吸收水分，呈现液滴状，这种产品需要放置在干燥器中保存。